



Het veulen

Waar moet je zoal aan denken om je veulentje gezond te houden? En welke verplichtingen heb je?



- **Ontwormen:** Voor veulens geldt een aangepast ontworming schema (zie onderaan dit artikel). Dit is belangrijk voor ieder veulen omdat veulens erg ziek kunnen worden van wormen. Symptomen die kunnen wijzen op een worm probleem zijn o.a. een dorre vacht, een dik buikje maar wel de ribben te zien, achterstand in de groei, slechte mest, koliek, futloos, hoesten, etc.
- **Vaccineren:** dit gebeurt op 6 maanden leeftijd. Vanaf de geboorte heeft het veulentje antistoffen uit de moedermelk opgenomen. Wanneer ze 6 maanden oud zijn, zijn deze antistoffen al voor een deel verbruikt, maar is het veulen gelukkig oud genoeg om een vaccinatie goed te ontvangen en zelf antistoffen op te bouwen. Het gaat hierbij om tetanus en influenza. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder 'Management en Preventie'.
- **Chippen & paspoort:** Alle paard-achtigen moeten volgens de wet tussen 6 weken en 6 maanden oud gechipt worden en daarbij een paspoort aanvragen. Het chippen en het invullen van de paspoort aanvraag kan door onze paardenarts gedaan worden. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de KFPS (Koninklijk Friesch Paarden Stamboek) - "*Aanvraag paardenpaspoort niet-friese paarden*".
- **Registratie:** Na het chippen moeten veulens óók verplicht geregistreerd worden bij het RVO!



- **De voeten:** Verder is het belangrijk om de stand van de hoeven in de gaten te houden en op tijd een beetje bij te vijlen. Laat het veulen op die manier ook gelijk aan de hoefsmid wennen.
- **Voeding:** Vanaf 2 weken leeftijd begint het veulen naast melk ook voorzichtig andere dingen te proberen, zoals de brokjes van de merrie of wat gras. Melk is dan nog steeds de voornaamste voedingsbron, maar zo kan het maag-darm kanaal langzaam wennen aan andere voedselbronnen. Veulens eten ook de mest van de merrie. Dit is normaal en ze doen dit om de darmflora in de dikke darm aan te vullen. In de eerste paar levensmaanden leert het veulen steeds meer gras, ruwvoer en brokken met de merrie mee te eten. Dit is belangrijk voor de darm, en zodat het veulen ten tijde van het afspenen gewend is aan het rantsoen.

Dierenartsenpraktijk



Voorthuizen | Uddel | Garderen

Veulen **schema voor ontwormen**

NB: dit schema is enkel een richtlijn voor het ontwormen van veulens. Indien er klachten zijn, zoals wormen in de mest, waterige diarree, een slechte vacht, sloom zijn, achterblijven in de groei, hoesten, of andere klachten, dan raden wij u aan om direct contact met ons op te nemen.

2 weken: ivermectine

2 maanden: ivermectine

4 maanden: wij raden aan om nu eens mestonderzoek te laten doen, omdat nu eventueel ook spoorwormen te vinden kunnen zijn. Afhankelijk van deze uitslag wordt vervolgens ontwormd met ivermectine of pyrantel (parascaris equorum). Indien geen mestonderzoek: blind ontwormen met panacur.

6 maanden: ivermectine

Eind kalenderjaar na de eerste vorst: moxidectine-praziquantel combinatie preparaat

Vanaf 1-jarige leeftijd is het advies elk seizoen eens mestonderzoek te doen en te ontwormen op basis van de uitslag. Door dan terughoudend te zijn met ontwormen (alleen indien het mestonderzoek het aangeeft) help je de jonge paarden om hun eigen immuniteit op te bouwen. Jaarlingers kunnen halverwege het weideseizoen nogmaals "bind" tegen spoorwormen ontwormd worden.

Let op: Indien uw veulen of jaarlinger een dorre vacht heeft, slappe mest en/of aan de schrale kant komt ondanks goed voeren, dan kunnen dat tekenen zijn dat er een worm besmetting plaats vindt.

Indien u naar aanleiding van deze richtlijn nog vragen heeft verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Het team van dierenartsenpraktijk V.U.G. B.V.